

EMBARAZO. Aunque casi ningún embarazo presenta complicaciones, existe un riesgo ligeramente superior de sufrir un ataque agudo durante o después del embarazo. No obstante, las probabilidades y peligros de un ataque agudo se reducen mucho si la porfiria se ha diagnosticado anteriormente. Por lo tanto, es muy importante que los médicos que le atiendan durante el embarazo sepan que tiene porfiria aguda.

7. TRATAMIENTO DE ATAQUES AGUDOS

Importancia del reconocimiento precoz y el diagnóstico exacto. El reconocimiento precoz de un ataque agudo siempre permite empezar antes el tratamiento. Las personas que han sufrido anteriormente de estos reconocen con facilidad los síntomas precoces anunciadores. Cuando los reconocen debe dejar todos los agentes desencadenantes, como cualquier tipo de medicación. Aumentar la ingesta de carbohidratos y dulces le ayudará a reducir la gravedad de los síntomas. En el momento en el que sospeche un ataque agudo, póngase en contacto con su médico para un ingreso urgente en el hospital.

Esto le permitirá:

- El diagnóstico bioquímico del ataque agudo determinando el contenido PBG en orina.
- El inicio inmediato del tratamiento específico del ataque agudo con Hematinicos intravenoso como Panhematin (Hematina) o Normosang (Hem Arginato).
- La administración de otros fármacos para tratar los distintos síntomas que acompañan al ataque; aliviar el dolor, las náuseas entre otros con medicamentos seguros.
- También es importante mantener un consumo adecuado de calorías además de una buena hidratación.

Los Hematinicos como **PANHEMATIN** y **NORMOSANG** ayudan a superar la deficiencia relativa de hemo en el hígado y elimina la reacción del organismo de incrementar la producción de los compuesto químicos (porfirinas y precursores) necesarios para la producción del hemo. Los hematinicos son el tratamiento de primera elección son medicamentos **NO POS** y de **ALTO COSTO**. En una crisis se necesitan 4 ampollas.


8. CÓMO PUEDES AYUDARNOS

1. Lleva la estrellita TOPI

Me encontrarás en almacenes y supermercados.

Soy la estrellita **TOPI** la esperanza de Vida para los pacientes con Porfiria en Colombia.

¡LLEVAME CONTIGO!
Así ayudarás a salvar VIDAS.



Fundación Colombiana para la Porfiria
\$ 1.000 pesos.

TOPI

2. Donando el cambio de tus compras

En los Almacenes o Supermercados adscritos a la "Fundación Colombiana para la Porfiria".


3. Deducciones Tributarias

Para persona natural y jurídica por concepto de donaciones. (Art. 125.1, 125.2, 125.3, 125.4 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. DIAN).

BANCOLOMBIA
CUENTA DE AHORROS No. 05237790911

AYUDANOS CON TU DONACIÓN
ASÍ LOS PACIENTES CON PORFIRIA TENDRÁN
"UNA ESPERANZA DE VIDA"

www.fundacioncolombianaparalaporfiria.org



Fundación Colombiana para la Porfiria

www.fundacioncolombianaparalaporfiria.org
presidente@fundacioncolombianaparalaporfiria.org
direccion@fundacioncolombianaparalaporfiria.org